






Problemas respiratorios

ASMA, FIEBRE DE HENO Y ANAFILAXIA



SISTEMA RESPIRATORIO





Alergias


Afección en la que el sistema inmunológico reacciona de forma anormal frente a una sustancia extraña no dañina (hipersensibilidad).

Las alergias son muy comunes y en ellas desempeñan un papel tanto los genes como el medio ambiente. El sistema inmunitario normalmente protege al cuerpo de sustancias nocivas como las bacterias y los virus. Este sistema también reacciona ante sustancias extrañas, llamadas alérgenos.



ASMA

- El asma afecta a todas las edades.
- Prevalencia más alta en niños de 5 a 17 años.
- Produce una sibilancia característica.
- Un ataque de asma puede ser causado por una respuesta alérgica a alimentos, alérgenos, severo estrés emocional, ejercicio, e infecciones respiratorias.
- En su forma mas grave puede producir anafilaxia.



Tratamiento

- Si la persona tiene su inhalador, ayude a aplicárselo.
- Aconseje respirar de manera lenta y profunda.
- Controle la situación a través de la calma.
- Dejar de hacer ejercicio. La persona debe descansar.
- Ayude a la hidratación.
- Si la persona no se recupera, evacue inmediatamente.



SILBANCIAS



TOS CRÓNICA



DIFICULTAD PARA
RESPIRAR



AUMENTO DE LA
FRECUENCIA
CARDÍACA



SÍNTOMAS DE ALERGIA
QUE AFECTAN A LA
RESPIRACIÓN



ESTRECHAMIENTO
DE LAS VÍAS
RESPIRATORIAS


Utilización del Inhalador

- 1. Destapar
- 2. Agitar
- 3. Colocar en la aerocámara
- 4. Colocar la aerocámara en la boca
- 5. Realizar PUFF
- 6. Coordinando con inhalación
- 7. Respirar 10 veces por la boca dentro de la aerocámara
- 8. Repetir el proceso después de 1 minuto



Shock Anafiláctico

- Es una reacción alérgica grave caracterizada por la hinchazón severa de la vía aérea y la dilatación de los vasos sanguíneos
- Los signos y síntomas pueden ser similares a los del asma.
- La vía aérea puede hincharse al grado de ser posible una obstrucción total.
- La epinefrina es el tratamiento de elección y el oxígeno y antihistamínicos son útiles.



SÍNTOMAS

Sistema nervioso central

- Aturdimiento
- Pérdida de conciencia
- Confusión
- Dolor de cabeza
- Ansiedad



Sistema respiratorio

- Dificultad para respirar
- Sibilancias o estridor
- Ronquera
- Dolor al tragar
- Tos



Sistema digestivo

- Dolor abdominal tipo cólico
- Diarrea
- Vómitos




- Pérdida del control de la vejiga

- Hinchazón de la conjuntiva
- Rinorrea
- Hinchazón de labios, lengua y/o garganta

Sistema circulatorio



- Frecuencia cardíaca rápida o lenta
- Presión arterial baja



- Dolor pélvico

Piel

- Urticaria
- Picor
- Enrojecimiento





Abbildungen: Wüthrich

Abb. 1: Hauptmanifestationen einer Nahrungsmittelallergie an der Haut: **A)** Quincke-Ödem, **B)** Neurodermitisschub, **C)** Urtikaria

Tratamiento

El EpiPen de adulto libera 0,30 mg de epinefrina y el del niño libera 0,15mg)

1. Retire la tapa de seguridad, póngalo a través de la ropa, no pierda Tiempo.
2. Coloque la punta del auto inyector contra la parte lateral externa del muslo de la víctima.
3. Presione contra el muslo con firmeza hasta que sienta un clic, mantenga presionado firmemente durante 10 segundos.
4. Anote la hora de inyección y continúe con la evacuación.



