

Accidente Cerebro Vascular




ACV

Es una interrupción del flujo sanguíneo en un área específica del cerebro, que provoca la pérdida de función cerebral. Las células cerebrales dejarán de funcionar después de 3 minutos.

Las secuelas serán permanentes.


Existen dos tipos:

- ACV Isquémico (80-85%).
- ACV Hemorrágico (10-15%).




Factores de riesgo

- Fibrilación auricular: esta arritmia provoca la formación de coágulos en el corazón que se pueden desprender y viajar hasta el cerebro, taponando una arteria (embolia cerebral).
- Hipertensión arterial
- Obstrucciones en las arterias carótidas
- Diabetes
- Colesterol alto
- Fumar
- Malformaciones de las arterias cerebrales, como malformaciones arteriovenosas (MAV), o aneurisma cerebral



Síntomas

- Pérdida de fuerza repentina en la cara, brazo o pierna, especialmente si es en un sólo lado del cuerpo.
- Confusión repentina o problemas en el habla o la comprensión de lo que le dicen.
- Pérdida repentina de visión en uno o en ambos ojos.
- Dificultad repentina para caminar, mareos, o pérdida del equilibrio o de la coordinación.
- Dolor de cabeza fuerte, repentino, sin causa conocida.



AIT

Un ACV (accidente cerebrovascular) transitorio, también conocido como:

AIT (ataque isquémico transitorio) o "mini derrame", es un evento en el que el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe temporalmente.

Esto causa síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, pero duran solo unos minutos o horas, sin causar daño cerebral permanente

Reconocimiento

- En caso de estar frente a un posible accidente cerebro vascular, se recomienda utilizar la nemotecnia **FAST** para ayudar a recordar los signos de advertencia.

F		Cara (face) se cae un lado de la cara pedirle a la persona que sonría.
A		Brazos (arms) debilidad en extremidad pedirle a la persona que levante ambos brazos.
S		Habla (speech) dificultad para hablar, pedirle a la persona que repita una oración simple.
T		Tiempo (time) activar rápidamente la emergencia si observa alguno de estos signos de forma independiente o todos juntos.

Tratamiento

- Asegurar la escena.
- Llamar al 131 y explicar signos y síntomas, datos personales de la víctima y hora de inicio de los síntomas.
- Acomodar a la víctima en un lugar tranquilo.
- Posicionar la cabeza y el tronco de la víctima en 30°.
- Si pierde la conciencia, pero respira con normalidad, acomodarlo en posición lateral de seguridad.
- Reevaluar signos vitales constantemente y evaluar nivel de conciencia. Cada 5 a 10 minutos.

Preguntar si esta consumiendo algún medicamento como aspirina u otro.



NO SE DEBE

- Dar de comer ni beber a la víctima, ya que puede atragantarse.
- Forzarla para hablar o moverse.
- Administrar algún tipo de medicamento.
- Intentar sujetar a la víctima si aparecen convulsiones o se agita. Evita, aun así, que se haga daño.
- inmovilizar el cuello o ponerle cosas apretadas.
- Dejarla sola.
- Trasladar directamente a la víctima por tus medios sin esperar a los servicios de emergencias.

